


ATENCIÓN PRIMARIA



* Anticuerpo antitransglutaminasa tisular IgA.

** Si la sospecha clínica es elevada, derivar a especialista.

GRUPOS DE RIESGO

Familiares de primer grado
 Enfermedades autoinmunes
 Diabetes Mellitus Tipo I
 Tiroiditis autoinmune
 Déficit selectivo de IgA
 Síndrome de Down
 Intolerancia a la lactosa

¿Qué le puede ocurrir a un celiaco NO diagnosticado?

Dermatitis herpetiforme
 Artritis reumatoide
 Nefropatía por IgA
 Fibrosis quística
 Cirrosis biliar primaria
 Psoriasis

Alopecia areata
 Osteoporosis
 Colitis microscópica
 Insuficiencia pancreática
 Linfomas intestinales
 Carcinomas digestivos

Descárgate el Diagnóstico precoz de la enfermedad celiaca

www.celiacossevilla.org

CAMPAÑA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ SOBRE LA ENFERMEDAD CELIACA

SU PACIENTE TIENE...

DESNUTRICIÓN?
 TALLA BAJA?
 DIARREA CRÓNICA?
 DOLOR ABDOMINAL?




ANEMIA?
 OSTEOPOROSIS?
 ABORTOS ESPONTÁNEOS?



664 320 887
celiacossevilla@gmail.com
www.celiacossevilla.org

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



* Anticuerpo antitransglutaminasa tisular IgA
** Considerar otras causas de enteritis

¿Qué es la enfermedad celíaca?

La Enfermedad Celíaca es una intolerancia permanente al gluten. Es la enfermedad crónica intestinal más frecuente en España.

¿Qué es el gluten?

Es una proteína que se encuentra en algunos cereales: trigo, cebada, centeno, avena y triticale.

¿A quién afecta?

En España, afecta aproximadamente a 1 de cada 100 personas, pero sólo está diagnosticado el 20%. La padecen individuos genéticamente predispuestos, tanto niños como adultos. Puede presentarse a cualquier edad, a lo largo de toda la vida.

¿Qué produce?

Produce una atrofia de las vellosidades del intestino que causa una malabsorción de los nutrientes: proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento de la EC consiste en una dieta sin gluten seguida de forma estricta y durante toda la vida. Actualmente es el único tratamiento que existe.

Niños	Adolescentes	Adultos
Síntomas		
<ul style="list-style-type: none"> Deposiciones blandas Anorexia Vómitos Dolores abdominales Irritabilidad Apatía Introversión Tristeza 	<ul style="list-style-type: none"> Frecuentemente asintomáticos Dolor abdominal Cefaleas Artralgias Retraso menstrual Irregularidades menstruales Estreñimiento Deposiciones blandas 	<ul style="list-style-type: none"> Dispepsia Deposiciones blandas crónicas Dolor abdominal Síndrome intestino irritable Dolores óseos Infertilidad, abortos recurrentes Parestesias, tetania Ansiedad, depresión, epilepsia Ataxia
Signos		
<ul style="list-style-type: none"> Distensión abdominal Malnutrición Hipotrofia muscular Retraso estado-ponderal Dislexia, autismo Raquitismo Hematomas Anemias mixtas 	<ul style="list-style-type: none"> Aftas orales Hipoplasia del esmalte Distensión abdominal Debilidad muscular Talla baja Artritis, osteopenia Queratosis folicular Anemia por déficit de hierro 	<ul style="list-style-type: none"> Malnutrición Edemas periféricos Talla baja Neuropatía periférica Miopatía proximal Anemia ferropénica Hipertransaminemia Hipoesplenismo

**Cuadro exclusivamente orientativo de sintomatologías producidas por la EC*